

Empfehlungen der Nationalen Stillkommission Im ersten halben Jahr ist Muttermilch solo das Optimum

BDI aktuell Januar-2005, Seite 11

Literatur:

Kersting M (2001) Ernährung des Säuglings. Lebensmittel- und mahlzeitenbezogene Empfehlungen. *Monatsschr Kinderheilkd* 149: 4-10

Nationale Stillkommission (2001) Zur Frage der Zufütterung von gesunden, gestillten Neugeborenen. www.bfr.bund.de/cms/detail.php?id=425

Nationale Stillkommission (2003) Stillen und Berufstätigkeit. www.bfr.bund.de/cms/detail.php?id=425

Springer S, Kersting M, Nehlsen E, Przyrembel H (1999) Definitionen zu Säuglingsernährung. Vorschläge der Nationalen Stillkommission – Sagen wir, was wir meinen? *Sozialpädiatrie Kinder Jugendheilkunde* 21: 39-42

Weltgesundheitsorganisation (WHO) Division of Diarrhoeal and Acute Respiratory Disease Control (1991) Indications for assessing breast-feeding practices. Report of an Informal Meeting 11-12 June 1991, Genf (Dokument WHO/CDD/SER/91.14)

Weltgesundheitsorganisation (WHO) (2001) The optimal duration of exclusive breastfeeding. Report of an expert consultation. Genf, März 2001 (Dokument WHO/NHD/01.09, WHO/FCH/CAH/01.24)

Weltgesundheitsversammlung (WHA), 54. Sitzung (2001) Infant and young child nutrition (Dokument WHA54.2)

*Nationale Stillkommission am BfR
in: Bundesgesundheitsblatt 9-2004*